



Blodparametrar Kvinna Utökad

Blodbild

- ✓ Hemoglobin
- ✓ Leukocyter
- ✓ Trombocyter
- ✓ EVF
- ✓ MCH
- ✓ MCV
- ✓ MCHC

Blodfetter

- ✓ Triglycerider
- ✓ HDL Kolesterol
- ✓ LDL Kolesterol
- ✓ LDL/HDL Kvot
- ✓ Kolesterol

Blodsocker

- ✓ Blodsocker
- ✓ HbA1c

Hormoner

- ✓ FSH
- ✓ Östradiol

Hjärta kärl

- ✓ Apolipoprotein A1
- ✓ Apolipoprotein B
- ✓ ApoB/ApoA1 kvot
- ✓ Homocystein

Inflammation

- ✓ CRP hs
- ✓ SR

Leverfunktion

- ✓ ASAT
- ✓ ALAT
- ✓ Bilirubin
- ✓ ALP

Mineraler

- ✓ Järn
- ✓ Fosfat
- ✓ Ferritin
- ✓ Folat

Njurfunktion

- ✓ Kreatinin
- ✓ Natrium
- ✓ Kalium
- ✓ Albumin
- ✓ Kalk
- ✓ Urat
- ✓ Urea
- ✓ Cystin C

Vitaminer

- ✓ Kobalamin – B12
- ✓ 25OHD- D-vitamin
- ✓ Magnesium
- ✓ Zink

Ämnesomsättning

- ✓ TSH
- ✓ T3,fritt
- ✓ T4,fri3tt
- ✓ TPO ak



Blodparametrar Man Utökad

Blodbild

- ✓ Hemoglobin
- ✓ Leukocyter
- ✓ Trombocyter
- ✓ EVF
- ✓ MCH
- ✓ MCV
- ✓ MCHC

Blodfetter

- ✓ Triglycerider
- ✓ HDL Kolesterol
- ✓ LDL Kolesterol
- ✓ LDL/HDL Kvot
- ✓ Kolesterol

Blodsocker

- ✓ Blodsocker
- ✓ HbA1c

Hormoner

- ✓ Testosteron

Hjärta kärl

- ✓ Apolipoprotein A1
- ✓ Apolipoprotein B
- ✓ ApoB/ApoA1 kvot
- ✓ Homocystein

Inflammation

- ✓ CRP hs
- ✓ SR

Leverfunktion

- ✓ ASAT
- ✓ ALAT

- ✓ Bilirubin

- ✓ ALP

Mineraler

- ✓ Järn
- ✓ Fosfat
- ✓ Ferritin
- ✓ Folat

Njurfunktion

- ✓ Kreatinin
- ✓ Natrium
- ✓ Kalium
- ✓ Albumin
- ✓ Kalk
- ✓ Urat
- ✓ Urea
- ✓ Cystin C

Prostata

- ✓ PSA,total
- ✓ PSA fritt
- ✓ PSA,fritt/total kvot

Vitaminer

- ✓ Kobalamin – B12
- ✓ 25OHD- D-vitamin
- ✓ Magnesium
- ✓ Zink

Ämnesomsättning

- ✓ TSH
- ✓ T3,fritt
- ✓ T4,fri3tt
- ✓ TPO ak

Viktigt inför din provtagning

- Ta med legitimation
- Provet bör tas innan 10.00 då analysen är en dygnsvarierande parameter,
- Stress påverkar ditt analysresultat, därför är det viktigt att du sitter ner i lugn och ro i minst 15 min innan provtagningen på mottagningen.
- Träning eller annan fysisk aktivitet bör undvikas innan provtagning
- Är du kvinna i fertil ålder, kan det vara intressant att veta vart du befinner dig i din menscykel.

Mat och alkohol

- Provet ska tas fastande dvs ingen mat på 12 timmar innan provtagningen. Du kan dricka vatten, kaffe, te men utan mjölk och socker.
- Undvik fet mat och alkohol dagen före din provtagning.

Medicinering

- Mediciner som inte skall tas på morgonen innan provtagning
 - Järnmedicin
 - Levaxin
 - NSAID preparat som antiinflammatoriska medel samt lättare värk och febernedsättande medel.
- Analys bör inte utföras vid pågående eller efter nyss avslutad antibiotikabehandling.

•